



УДК 595.44(470.67)

## СОСТАВ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАУКОВ (ARANEI) РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

© 2009. Абдурахманов Г.М., Алиева С.В.

Дагестанский государственный университет

В статье даются итоги изучения фауны и географического распространения пауков Дагестана. К настоящему времени состав фауны пауков включает 25 семейств, 103 рода, 200 видов, из которых для Дагестана впервые отмечено 98 видов, а два вида описаны как новые для науки (*Drassodes dagestanus* sp.n. и *Drassodes archibensis* sp.n. [5].)

There are the results of studying fauna and geographical spreading of the spiders of Dagestan. Now the fauna of spiders consists of 25 families, 103 genus and 200 species, from which 98 species are noted for Dagestan for the first time, and 2 species are described as new for the science. (*Drassodes dagestanus* sp.n. и *Drassodes archibensis* sp.n. [5].)

**Ключевые слова:** пауки, вид, Дагестан, район

**Key words:** spiders, species, Daghestan, district

Несмотря на то, что пауки представляют собой группу многочисленных и имеющих огромное значение животных, которые до сих пор еще сравнительно слабо изучены, во многих регионах фауна их остается нетронутой. Одним из таких регионов является Дагестан. В процессе личных сборов авторов и обработки коллекционных материалов, хранящихся в различных научных, учебных заведениях, для территории Дагестана составлен список из 200 видов пауков, принадлежащих 103 родам и 25 семействам. Самым многочисленным семейством в видовом отношении является *Lycosidae* (38 видов), далее семейство *Linyphiidae* (27 видов) и семейство *Thomisidae* (20 видов). По 19 видов в семействах *Theridiidae* и *Gnaphosidae*.

Среди сборов есть интересные находки: *Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871) – отмечен впервые для фауны России; *Agroeca maculatan* L.Koch, 1879 – ранее самая западная находка была в Казахстане; *Achaeareana simulans* (Thorell, 1875) – вид космополит, характерен для тропиков; *Hypriotes paradoxus* (C.L.Koch, 1834) – является редким.

Аннотированный список видов, приводится по К.Г. Михайлову (1997). [3]

### СЕМЕЙСТВО PHOLCIDAE

Под *Pholcus* Walckenaer, 1805. На территории бывшего СССР известно 11 видов. В Дагестане к настоящему времени обнаружено 2 вида:

*Pholcus alticeps* Spassky, 1932. Дагестан: 25 км СЗ Буйнакска, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).[2]

*Pholcus ponticus* Thorell, 1875. Дагестан: 15 км З Буйнакска, окр. с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007)

### СЕМЕЙСТВО DYSDERIDAE

Под *Dysdera* Latreille, 1804 включает 51 вид. В Дагестане встречаются 3 вида:

*Dysdera azerbaijanica* Charitonov, 1956. Дагестан: западные окр. Дербента (Дунин, 1992).

*Dysdera daghestanica* Dunin, 1991. Дагестан: 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонех, Хварши, июнь – июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь – июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, 2 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 40 км юго-западнее Дербента, с. Хучни (Дунин, 1991а).

*Dysdera incognita*? Дагестан: 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева. Замечания. Вид *D. incognita* характерен для западного Кавказа, где обитает в предгорьях (Дунин, 1992). Недавно был обнаружен в Ростовской области (Пономарёв, Цветкова, 2003). Наши экземпляры несколько отличаются от описания, сделанного П.М. Дунином (1991). Не исключено, что мы имеем новый, близкий к *D. incognita* вид.



Род *Harpactea* Bristowe, 1939 включает 36 видов. В Дагестане встречается 2 вида:  
*Harpactea indistincta* Dunin, 1991. Дагестан: Самурский р-н, Гарах, (Дунин, 1991б).  
*Harpactea modesta* Dunin, 1991. Дагестан: 40 км юго-западнее Дербента, с. Хучни (Дунин, 1991б).

#### СЕМЕЙСТВО ERESIDAE

Подрод *Eresus* Walckenaer, 1805 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:  
*Eresus cinnaberinus* (Oliver, 1787). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

#### СЕМЕЙСТВО ULOBORIDAE

Подрод *Hyptiotes* Walckenaer, 1837 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:  
*Hyptiotes paradoxus* (C.L.Koch, 1834). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО THERIDIIDAE

Подрод *Achaearanea* Strand, 1929 включает 6 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:  
*Achaearanea lunata* (Clerck, 1758). Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Achaearanea simulans* (Thorell, 1875). Дагестан: 26 ♀, 2 ♂, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Achaearanea tepidariorum* (C.L. Koch, 1841). Дагестан: Буйнакский р-н, 25 км СЗ Буйнакска, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Подрод *Enoplognatha* Pavesi, 1880 включает 13 видов. В Дагестане встречаются 5 видов:

*Enoplognatha diversa* (Blackwall 1859). Дагестан: 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Enoplognatha latimana* Hippa et Oksala, 1982. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 6 ♂, 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Enoplognatha oelandica* (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Enoplognatha ovata* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева. Чеченская республика: 4 ♂, с. Ведичи, Июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Enoplognatha* sp. группы *ovata*. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, Июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Подрод *Latrodectus* Walckenaer, 1805 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:  
*Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790). Дагестан, Терско-Ногайские степи, Табасаран, Ахты, (Россиков, 1904); Кизляр, (Мориц, 1914); о. Чечень, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Подрод *Robertus* O. Pickard-Cambridge, 1879 включает 14 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Robertus arundineti* (O.Pickard-Cambridge, 1871). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М.

Подрод *Steatoda* Sundevall, 1833 включает 12 видов. В Дагестане встречаются 5 видов:  
*Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778). Дагестан: 3 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.  
*Steatoda castanea* (Clerck, 1758), Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Steatoda phalerata* (Panzer, 1801). Дагестан: 11 ♀, 2 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, Алиева С.В.; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.



*Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1806). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М.; 5 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 2 ♀, Махачкала 2002, Алиева С.В.; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский район, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Theridion* Walckenaer, 1805 включает 39 видов. В Дагестане встречаются 4 вида:

*Theridion impressum* L.Koch, 1881. Дагестан: 8 ♀, 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Theridion nigrovariegatum* Simon, 1873. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Theridion tinctum* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Дербентский район, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева.

*Theridion pinastri* L.Koch, 1872. Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО LINYPHIIDAE

Род *Asthenargus* Simon et Fage, 1922 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Asthenargus caucasicus* Tanasevitch, 1987. Дагестан: Сергокала (Танасевич, 1987); долина р. Чирагчай, Сардакент (Танасевич, 1987); бассейн р. Самур, окр. с. Гарах (Танасевич, 1987).

Род *Centromerus* F.Dahl, 1886 включает 29 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Centromerus minor* Tanasevitch, 1990. Дагестан: долина р. Самур, окр. с. Гарах. (Танасевич, 1981).[4]

Род *Diplocephalus* Bertkau in Forster et Bertkau, 1883 включает 20 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987).

Род *Diplostyla* Emerton, 1882 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

*Diplostyla concolor* (Wider, 1834). Дагестан: долина р. Чираг-чай, Хив (Танасевич, 1987); Буйнакский район, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Entelecara* Simon, 1884 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Entelecara acuminata* (Wider, 1834). Дагестан: Верхний Гуниб (Танасевич, 1987).

Род *Gnathonarium* Karsch, 1881 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834). Дагестан: долина р. Самур (Танасевич, 1987).

Род *Gongulidiellum* Simon, 1884 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Gongulidiellum latebricola* (O.Pickard-Cambridge, 1871). Дагестан: Леваши (Танасевич, 1987).

Род *Incestophantes* Tanasevitch, 1992 включает 13 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Incestophantes amotus* (Tanasevitch, 1990). Дагестан: 1 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Leptyphantes* Menge, 1866 включает 122 вида. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Leptyphantes obscurus* (Blackwall, 1841). Дагестан: Леваши (А.В. Танасевич, 1987) [4]

*Leptyphantes quadrimaculatus* Kulzynski, 1898. Дагестан: долина р. Самура, окр. с. Гарах (Танасевич, 1987).

Род *Linyphia* Latreille, 1804 включает 7 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Linyphia hortensis* Sundevall, 1830. Буйнакский р-н, окр. с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Mansuphantes* Saaristo & Tanasevitch, 1996 включает 13 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Mansuphantes parvatus* (Tanasevitch, 1990). Дагестан: долина р. Самура, окр. с. Гарах (Танасевич, 1987).

Род *Metropobactrus* Simon, 1884 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Metropobactrus prominulus* (O.Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: Верхний Гуниб (Танасевич, 1987).

Род *Micrargus* F.Dahl, 1886 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987).

Род *Microlinyphia* Gerhardt, 1928 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:



*Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; окр. с. Верхнее Казанище; окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Microneta* Menge, 1869 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Microneta viaria* (Blackwall, 1841). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987).

Род *Neriene* Blackwall, 1833 включает 14 видов. В Дагестане встречаются 4 вида:

*Neriene emphana* (Walckenaer, 1841). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; окр. с. Верхний Карапай. (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Neriene montana* (Clerck, 1758). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Neriene peltata* (Wider, 1834). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Neriene radiata* (Walckenaer, 1841). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Pocadicnemis* Simon, 1884 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

*Pocadicnemis rutila* (Blackwall, 1841). Дагестан: Верхний Гуниб, Серокала (Танасевич, 1987).

Род *Savignya* Blackwall, 1833 включает 12 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Savignya frontata* Blackwall, 1833. Дагестан: Верхний Гуниб (Танасевич, 1987).

Род *Silometopus* Simon, 1926 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Silometopus elegans* (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: Буйнакский р-н, Улубий-аул (Танасевич, 1987).

Род *Stemonyphantes* Menge, 1866 включает 10 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Walckenanaeria* Blackwall, 1833 включает 40 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

*Walckenanaeria antica* (Wider, 1834). Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Танасевич, 1987). [4]

*Walckenanaeria capito* (Westring, 1861). Россия, Дагестан: Серокала (Танасевич, 1987).

*Walckenanaeria monoceros* (Wider, 1834). Дагестан: 2 ♀, Ахтынский район, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО TETRAGNATHIDAE

Род *Metellina* Chamberlin et Ivie, 1941 включает 5 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Metellina segmentata* (Clerck, 1758). Дагестан: 7 ♂, 5 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♂, 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Metellina* sp. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Pachygnatha* Sundevall, 1823 включает 4 вида. В Дагестане встречаются 3 вида:

*Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823. Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

*Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830. Дагестан: 1 ♂, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; окр. с. Верхний Карапай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Tetragnatha* Latreille, 1804 включает 17 видов. В Дагестане встречаются 4 вида:

*Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Tetragnatha montana* Simon, 1874. Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.



*Tetragnatha obtusa* C.L.Koch, 1837. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886. Дагестан: 1 ♂, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО ARANEIDAE

Под *Aculepeira* Chamberlin et Ivie, 1942 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид: *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, 7 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.; 1 ♂, 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

Под *Agalenataea* Archer, 1951 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид: *Agalenataea redii* (Scopoli, 1763). Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева. Дагестан (Кронберг, 1875)

Под *Araneus* Clerck, 1758 включает 44 вида. В Дагестане встречаются 5 видов:

*Araneus angulatus* Clerck, 1758. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева.

*Araneus diadematus* Clerck, 1758. Дагестан: 1 ♂, 9 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, 4 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♂, 4 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов. Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007). [2]

*Araneus marmoreus* Clerck, 1758. Дагестан: 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Araneus quadratus* Clerck, 1758. Дагестан: 4 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Araneus pallasi* (Thorell, 1875). Дагестан: окрестности Кизляра (Мариковский, Марусик, 1985)

Под *Araniella* Chamberlin et Ivie, 1942 включает 6 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Araniella cucurbitina* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 5 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели; с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Araniella opistographa* (Kulczynski, 1905). Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 6 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Под *Argiope* Savigny et Audouin, 1826 включает 3 вида. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева.

*Argiope* sp. Дагестан: 1 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева. Замечание. Вид очень близок к распространенному на юге России виду *A. lobata* (Pallas, 1772), однако сильно отличается окраской и формой эпигина, что не позволяет отнести наш вид к *A. lobata*. Отсутствие в нашей коллекции самцов затрудняет точную диагностику указанной самки.

Под *Cyclosa* Menge, 1866 включает 8 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Cyclosa conica* (Pallas, 1772). Дагестан: Буйнакский район, с. Верхнее Казанище, окр. с.

Верхний Карапай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Cyclosa sierrae* Simon, 1870. Дагестан: 8 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева. Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

Под *Larinoides* Caporiacco, 1934 включает 6 видов. В Дагестане встречаются 1 вид:

*Larinoides ixobolus* (Thorell, 1873). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.

Под *Mangora* O. Pickard-Cambridge, 1889 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

*Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 2 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-



н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 3 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Neoscona* Simon, 1864 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Neoscona adianta* (Walckenaer). Дагестан: 1 ♂, 14 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 2 ♀, 4 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 4 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Абдурахманов Г.М.; 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Nuctenea* Simon, 1864 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Nuctenea umbratica* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Род *Zilla* C.L.Koch, 1834 включает 2 вида. В Дагестане встречаются 1 вид:

*Zilla diodia* (Walckenaer, 1802) Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Zygiella montana* (C.L.Koch, 1839). Дагестан: Магарамкентский р-н, долина р. Самур (Завадский А.М., 1902).

#### СЕМЕЙСТВО LYCOSIDAE

Род *Alopecosa* Simon, 1885 включает 104 вида. В Дагестане встречаются 5 видов:

*Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Ахтынский р-н, с. Куруш (J.Buchar, K.Thaler, 1898). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

*Alopecosa cronebergi* (Thorell, 1875). Дагестан: Дербент (Thorell, 1875).

*Alopecosa cuneata* (Clerck, 1758) Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757). Дагестан: 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Alopecosa* sp. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Абдурахманов Г.М.

Род *Allohogna* Roewer, 1955 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 2 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева.

Род *Hogna* Simon, 1885 включает 1 вид. В Дагестане встречается 1 вид:

*Hogna radiata* (Latreille, 1817). Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 juv ♀ Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева.

Род *Lycosa* Latreille, 1804 включает 12 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Lycosa bergsoei* (Thorell, 1875). Дагестан: Дербент (Thorell, 1875).

Род *Mustelicosa* Roewer, 1960 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Mustelicosa dimidiata* (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 8 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Pardosa* C.L.Koch, 1847 включает 102 вида. В Дагестане встречается 20 видов:

*Pardosa agrestis* (Westring, 1861). Дагестан: 2 ♂, 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, Чародинский р-н, с. Арчип, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 23 ♀, 5 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище; окр. с. Верхний Каранай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Абдурахманов Г.М.; 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa amentata* (Clerck, 1758). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.



*Pardosa aquila* Buchar et Thaler, 1998. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Дагестан: Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898).

*Pardosa bifasciata* (C.L. Koch, 1836). Дагестан: 5 ♀, 7 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Pardosa buchari* Ovtsharenko, 1979. Дагестан: 15 ♀, 6 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 4 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 22 ♀, 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Абдурахманов Г.М.; 2 ♀, 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов;

*Pardosa caucasica* Ovtsharenko, 1979. Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa dagestanica* Buchar et Thaler, 1998. Дагестан: Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898).

*Pardosa ibex* Buchar et Thaler, 1998. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов, Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898).

*Pardosa incerta* Nosek, 1905. Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa italicica* Tongiorgi, 1966. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Pardosa hortensis* (Thorell, 1872). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Pardosa nebulosa* (Thorell, 1872). Дагестан: 1 ♀, Махачкала, 2004, С.В. Алиева, Дербент (T. Thorell, 1875)

*Pardosa paludicola* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa pirkuliensis* Zyuzin et Logunov, 2000. Дагестан: 6 ♂, 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 2 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa pontica* (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa proxima* (C.L.Koch, 1847). Дагестан: 1 ♀, Хивский район, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Pardosa schenkeli* Lessert, 1904. Дагестан: Ахтынский р-н, с. Куруш, г. Шалбуздаг (Buchar, Thaler, 1898)

*Pardosa tatarica* (Thorell, 1875). Дагестан: 1 ♂, 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Pardosa tasevi* Buchar, 1968. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Pardosa vittata* (Keyserling, 1863). Дагестан: 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.



*Pardosa* sp. группы *monticola*. Дагестан: 1 ♂, 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Pirata* Sundevall, 1832 включает 15 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Pirata knorri* (Scopoli, 1763). Дагестан: 5 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Pirata piraticus* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Tricca* Simon, 1889 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Tricca lutetiana* (Simon, 1876). Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Trochosa* C.L.Koch, 1847 включает 9 видов. В Дагестане встречается 3 вида:

*Trochosa robusta* (Simon, 1876). Дагестан: 2 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Trochosa ruricola* (De Geer, 1778). Дагестан: 6 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Trochosa terricola* Thorell, 1856. Дагестан: 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Xerolycosa* F.Dahl, 1908 включает 2 вида. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Xerolycosa miniata* (C.L. Koch, 1834). Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861). Дагестан. Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

#### СЕМЕЙСТВО PISAURIDAE

Род *Pisaura* Simon, 1885 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Pisaura mirabilis* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 2 ♂, 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2004, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

#### СЕМЕЙСТВО AGELENIDAE

Род *Agelena* Walckenaer, 1805 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Agelena labyrinthica* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов; 12 ♀, 4 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Tegenaria* Latreille, 1804 включает 17 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Tegenaria domestica* (Clerck, 1758). Дагестан: 2 ♀, Махачкала, 2002, С.В. Алиева.

*Tegenaria* sp.. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Род *Malthonica* Simon, 1898 включает 42 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Malthonica* sp. Дагестан 3 ♀, Дербентский р-н, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

#### СЕМЕЙСТВО ARGYRONETIDAE

Род *Argyroneta* Latreille, 1804 включает 1 вид. В Дагестане встречается я 1 вид:

*Argyroneta aquatica* (Clerck, 1758). Дагестан (С.Ю. Ибрагимов, 1975)

#### СЕМЕЙСТВО DICTYNIDAE

Род *Lathys* Simon, 1889 включает 6 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Lathys humilis* (Blackwall, 1855). Дагестан 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО AMAUROBIIDAE

Род *Coelotes* Blackwall, 1841 включает 12 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Coelotes* sp. Дагестан 5 ♀, 1 ♂, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов; 13 ♀, Чародинский р-н, с. Арчип, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 39 ♀, 5 ♂,



Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 5 ♀, 3 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

#### СЕМЕЙСТВО TITANOECIDAE

Под *Titanoeeca* Thorell, 1869 включает 19 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Titanoeeca* sp. Дагестан: 1 ♀, Унцукульский район, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

#### СЕМЕЙСТВО OXYOPIDAE

Под *Oxyopes* Latreille, 1804 включает 8 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

*Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804). Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

#### СЕМЕЙСТВО ANYRHAENIDAE

Под *Anyphaena* Sundevall, 1833 включает 3 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО LIOCRANIDAE

Под *Agroeca* Westring, 1861 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Agroeca maculata* L.Koch, 1879. Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Замечание. Ранее самая западная находка вида была зафиксирована в Западном Казахстане на Индерской возвышенности (Пономарёв, Цветков, 2004). Пономарёв А.В., Цветков А.С.

Под *Phrurolithus* C.L.Koch, 1839 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Phrurolithus festivus* (C.L.Koch, 1835). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

#### СЕМЕЙСТВО MITURGIDAE

Под *Cheiracanthium* C. L. Koch, 1839 включает 5 видов. В Дагестане встречаются 2 вида:

*Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864. Дагестан: 1 ♂, Махачкала, 2005, С.В. Алиева.

#### СЕМЕЙСТВО CLUBIONIDAE

Под *Clubiona* Latreille, 1804 включает 87 видов. В Дагестане встречается 3 вида:

*Clubiona golovatchi* Michailov, 1990. Дагестан: Долина р. Чирагчай, Сардакент, Хив; долина р. Самур, Гарах (K.G. Mikhailov, 1990)

*Clubiona lutescens* Westring, 1851. Дагестан: долина р. Чирагчай, Хив (Mikhailov, 1990)

Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Clubiona neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862. Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Долина р. Самур (K.G. Mikhailov, 1990).

#### СЕМЕЙСТВО GNAPHOSIDAE

Под *Drassodes* Westring, 1851 включает 30 видов. В Дагестане встречаются 6 видов:

*Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Drassodes lutescens* (C.L.Koch, 1839). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Drassodes pubescens* (Thorell, 1856). Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Drassodes dagestanus* sp.n. Дагестан: 3 ♂, 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 12 ♀, 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 6 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Дополнительный материал. Чеченская республика: 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. [5]

*Drassodes* sp.2. Дагестан: 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.



*Drassodes archibensis* sp.n. Дагестан: 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. [5]

Под *Drassyllus* Chamberlin, 1922 включает 5 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

*Drassyllus praeficus* (L. Koch, 1866). Дагестан: 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Drassylus pumilus* (C.L.Koch, 1839). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Drassylus pussillus* (C.L.Koch, 1833). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Под *Gnaphosa* Latreille, 1804 включает 69 видов. В Дагестане встречаются 5 видов:

*Gnaphosa leporina* (L.Koch, 1866). Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Gnaphosa lugubris* (C.L. Koch, 1839). Дагестан: 1 ♂, 10 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 7 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Gnaphosa taurica* Thorell, 1875. Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 6 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Gnaphosa* sp.? группы *leporina*. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

*Gnaphosa* sp.? Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Под *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 включает 16 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Haplodrassus signifer* (C.L.Koch, 1839). Дагестан: 1 ♂, 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

Под *Micaria* Westring, 1851 включает 27 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Micaria formicaria* (Sundevall, 1831). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Под *Scotophaeus* Simon, 1893 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Scotophaeus scutulatus* (L. Koch, 1866). Дагестан: 1 ♀, Махачкала, 2004. С.В. Алиева.

Под *Zelotes* Gistel, 1848 включает 49 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

*Zelotes latreillei* (Simon, 1878). Дагестан: 1 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, Июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Zelotes subterraneus* (C.L.Koch, 1833). Дагестан: 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. Чеченская республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО ZORIDAE

Под *Zora* C.L.Koch, 1847 включает 7 видов. В Дагестане встречаются 3 вида:

*Zora armillata* Simon, 1878. Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Карапай, (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Zora nemoralis* (Blackwall, 1861). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Zora spinimana* (Sundevall, 1832). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, с. Верхнее Казанище (Пономарёв, Халидов, 2007).

#### СЕМЕЙСТВО PHILODROMIDAE

Под *Philidromus* Walckenaer, 1826 включает 34 вида. В Дагестане встречается 3 вида:

*Philidromus cespitum* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский район, с. Майданскоое, июль 2002, С.В. Алиева. Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.



*Philidromus dispar* Walckenaer, 1826. Дагестан: 1 ♂, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).

*Philidromus margaritatus* (Clerck, 1758). Чеченская республика: 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Thanatus* C.L.Koch, 1837 включает 29 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Thanatus atratus* Simon, 1875. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов.

Род *Tibellus* Simon, 1875 включает 8 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802). Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007).

#### СЕМЕЙСТВО THOMISIDAE

Род *Ebrehtella* Dahl, 1907 включает 11 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Ebrehtella tricuspidata* (Fabricius, 1775). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♀, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 2 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Misumena* Latreille, 1804 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Misumena vatia* (Clerck, 1758). Дагестан: 5 ♀, 1 ♂, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 3 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

Род *Misumenops* O. Pickard-Cambridge, 1900 включает 4 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Misumenops tricuspidata* (Fabricius, 1775). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

Род *Ozyptila* Simon, 1864 включает 24 вида. В Дагестане встречается 2 вида:

*Ozyptila lugubris* (Kroneberg, 1875). Дагестан: о. Чечень (С.И. Сигида, 2002)

*Ozyptila orientalis* Kulczynski, 1926. Дагестан: 1 ♀, Чародинский р-н, с. Арчеб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, 1 ♂, Ахтынский р-н, июнь-июль 1991, с. Куруш, Г.М. Абдурахманов.

Род *Runcinia* Simon, 1875 включает 30 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Runcinia grammica* (C. L. Koch, 1837). Дагестан: 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

Род *Synema* Simon, 1864 включает 6 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

*Synema globosum* (Fabricius, 1775). Дагестан: 1 ♂, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская республика: 3 ♂, 2 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 7 ♂, 10 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Synema plorator* (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: 1 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2004, С.В. Алиева.

Род *Thomisus* Walckenaer, 1805 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Thomisus onustus* Walckenaer, 1805. Дагестан: 2 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 3 ♀, 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

Род *Tmarus* Simon, 1875 включает 6 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Tmarus piger* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Магарамкентский р-н, Самурский лес, 5.06.1991, Г.М. Абдурахманов.

Род *Xysticus* C.L.Koch, 1835 включает 107 видов. В Дагестане встречается 10 видов:

*Xysticus atevis* Ovtsharenko, 1979л. Дагестан: 1 ♂, Чародинский р-н, с. Арчеб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Xysticus bacurianensis* Mccheidze, 1971. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 7 ♀, Чародинский р-н, с. Арчеб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.



*Xysticus bifasciatus* C.L.Koch, 1837. Дагестан: 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева. Чеченская Республика: 3 ♀, 2 ♂ с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Xysticus crissatus* (Clerck, 1758). Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов. Чеченская Республика: 1 ♀, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 3 ♀, 6 ♂ с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Xysticus gallicus* Simon, 1875. Дагестан: 2 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Чародинский р-н, с. Арчиб, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов; 2 ♀, Цумадинский р-н, села Инхоквари, Хонох, Хварши, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов.

*Xysticus umbrinus* Utotschkin, 1968. Чеченская Республика: 2 ♂, 2 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Xysticus nimii* (Thorell, 1872). Дагестан: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов. Чеченская Республика: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

*Xysticus robustus* (Hahn, 1832). Дагестан: 3 ♀, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева.

*Xysticus soderbomi* Schenkel, 1936. Дагестан: 1 ♀, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева.

*Xysticus kochi* Thorell, 1872. Дагестан: 5 ♀, Унцукульский р-н, с. Майданское, июль 2002, С.В. Алиева; 1 ♂, Хивский р-н, села Кандик, Чувек, Цундык, июль 2005, С.В. Алиева; 2 ♀, Дербентский район, с. Аглоби, июнь 2004, С.В. Алиева, Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская Республика: 1 ♂, с. Итум-Кале, июль 1989, Г.М. Абдурахманов; 1 ♀, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Г.М. Абдурахманов.

#### СЕМЕЙСТВО SALTICIDAE

Род *Cyrba* Simon, 1876 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Cyrba algerina* (Lucas, 1846). Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 2002)

Род *Evarcha* Simon, 1902 включает 7 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Evarcha arcuata* (Clerck, 1758). Дагестан: Буйнакский р-н, окр. с. Эрпели (Пономарёв, Халидов, 2007). Чеченская Республика: 1 ♂, с. Ведичи, июнь-июль 1990, Абдурахманов Г.М.

Род *Heliophanus* C.L.Koch, 1833 включает 27 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

*Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802). Дагестан: Южный Дагестан (Rakov, Logunov, 1997)

*Heliophanus mordax* (O. Pickard-Cambridge, 1872). Дагестан: Дербент (D.V.Logunov, E.F.Guseinov, 2002); Кизилорт, (S.Yu. Rakov, D.V. Logunov, 1997)

Род *Macaroeris* Wunderlich, 1992 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802). Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 2002).

Род *Mogrus* Simon, 1882 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Mogrus neglectus* (Simon, 1868). Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 2002).

Род *Neon* Simon, 1876 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Neon rayi* (Simon, 1875). Дагестан: Сергокала (Logunov, Guseinov, 2002).

Род *Pellenes* Simon, 1876 включает 20 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Pellenes turkmenicus* Logunov, Marusik et Rakov, 1999. Дагестан: Дербент (Logunov, Marusik, Rakov, 1999)

Род *Philaeus* Thorell, 1869 включает 2 вида. В Дагестане встречается 1 вид:

*Philaeus chrysops* (Poda, 1761). Дагестан: 1 ♂, Унцукульский р-н, Ирганай сад, июнь-июль 1991 Г.М. Абдурахманов; 1 ♂, Махачкала 2005, С.В. Алиева, Дербент (Logunov, Guseinov, 2002).

Род *Phlegra* Simon, 1876 включает 5 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Phlegra cinereofasciata* Simon, 1868. Дагестан: Дербент (Logunov, Guseinov, 1876; Azarkina, 2002)

Род *Pseudicius* Simon, 1885 включает 7 видов. В Дагестане встречается 1 вид:

*Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802). Дагестан: 1 ♀, Дербентский р-н, село Аглоби, июнь 2004, Алиева С.В.

Род *Pseudeuophrys* Dahl, 1912 включает 8 видов. В Дагестане встречается 2 вида:

*Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826). Дагестан: Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, окр. с. Верхний Карапай (Пономарёв, Халидов, 2007).



*Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871). Дагестан: 1 ♂, Ахтынский р-н, с. Куруш, июнь-июль 1991, Абдурахманов Г.М. Замечание. Новый вид для фауны России. Известен из Грузии, Болгарии.

Под *Salticus* Latreille, 1804 включает 9 видов. В Дагестане встречается 1 вид:  
*Salticus tricinctus* (C.L.Koch, 1846). Буйнакский р-н, с. Верхнее Казанище, 9.06.2006 (Пономарёв, Халидов, 2007).

### Библиографический список

1. Ажеганова Н.С. Краткий определитель пауков. – Ленинград, 1968. – 152 с.
2. Пономарев А.В., А.Х.Халидов. К фауне пауков (Aranei) Дагестана. // Вестник Южного Научного Центра РАН. 2007.- Том 3. № 2. стр. 72-78.
3. Михайлов К.Г. Каталог пауков территорий бывшего СССР. - Москва. - 1997.
4. Танасевич А.В. Пауки семейства Linyphidae фауны Кавказа. // Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. Сборник научных трудов. Академия Наук СССР. – М.: «Наука». 1990.
5. Пономарев А.В., Алиева С.В. Новые виды пауков рода Drassodes Westring, 1851 (Aranei: Gnaphosidae) из Дагестана. Кавказский Энтомологический бюллетень, Ростов-на-Дону РАН Южный Научный Центр. 2008. том 4, выпуск 3 – стр.255-257.

УДК 574.55 (262.81)

## ДИНАМИКА УЛОВОВ И ЗАПАСОВ ТЮЛЕК КАСПИЙСКОГО МОРЯ

© 2009 Иванов В.П., Зыков Л.А.

Астраханский государственный технический университет

В статье приводятся многолетние данные о запасах и уловах каспийских тюлек (килек). Анализируются причины их динамики.

The long-term data on stocks and catching of the Caspian sprat are presented. The reasons of its dynamics are analyzed.

**Ключевые слова:** Каспийское море, килька, запасы.

**Keywords:** Caspian Sea, sprat, stocks.

В Каспийском море обитают 3 вида тюлек (килек): анчоусовидная *Clupeonella engrauliformes* (Borodin, 1904), большеглазая *C. grimmii* Kessler, 1877 и черноморско-каспийская, представленная подвидом каспийской тюльки *C. cultriventris caspia* (Svetovidov, 1941), известная более как обыкновенная килька *C. delicatula* Berg, 1932. Из них каспийская тюлька является эвригалинной и распространена повсеместно в море, в реках Волге, Урале, Тереке, а также в Цимлянском и во всех волжских водохранилищах. Анчоусовидная и большеглазая тюльки - морские соленолюбивые виды и населяют Средний и Южный Каспий.

До конца XX столетия в научной литературе и промысловый статистике каспийские тюльки носили название кильки. В настоящее время за ними закреплено правильное наименование тюльки (Аннотированный каталог, 1998). Настоящие кильки представлены в водах России черноморским и балтийским подвидами широты *Sprattus sprattus* (Linnaeus, 1758). Однако в промысловый статистике каспийские тюльки по-прежнему отражаются как кильки. В связи с этим употребляются оба их названия.

Лов кильек на Каспии начался в 30-е годы XX столетия, в 1930 году зарегистрирован улов их 600 тонн. В 1935 г. он достиг 4,5 тыс. т., но до 1945 г. не превышал 10 тыс. т. Объектом промысла служила каспийская тюлька (обыкновенная килька). Лов ее осуществлялся у берегов Дагестана, Азербайджана, а затем Казахстана (в районе Баутино) ставными (скипастями) и обтяженными неводами (аламанами), отсюда ее местные названия «береговушка», «аламанка».